武備志

防風茅元儀輯

軍資乘

餉 八

米鹽

太白陰經曰、一軍萬二千五百人、人日支米二升、一月六斗、一年七石二斗、一軍日支二百五十石、一月七千五百石、一年九萬石、以六分支粟、一人支粟三升三合三勺三抄三圭三粒、一月一石、一

年一十二石、一軍一年十四萬七千五百、內小月支九斗六升六合六勺六抄六圭六粒、其大麥八分、小麥六分、蕎麥四分、大荳八分、小荳七分、豌荳七分、麻七分、黍七分、幷依分數折米、人鹽、人一日支半合、一月一升五合、一年一斗八升、一軍一日六石二斗五升、二月一百八十七石五斗、一年二千二百五十石、

宴犒

太白陰經曰、宴犒酒、一人二升、二百五十石、羊一

口、分爲二十節、六百二十五口、牛肉代羊肉、一人二斤、二萬五千斤、白米一人五合六十二石五斗、糯米一人三合三十七石五斗、薄餅一人二番麪一斗作二十番、一百二十五石、捻頭、卽饅頭、一人一枚、麪一斗作三十枚、四十一石六斗六升七合、饅餅、一人一箇、一斗麪作十箇、麪一百二十五石、蒸餅、一人一顆、麪一斗作十顆、一百二十五石、餺飥、一人一番、麪一斗作三十番、四十一石六斗六升七合、餛、卽饊子、一人二顆、麪一斗作一百顆五十五

石餺饠、一人一箇、麪一斗、作八十箇、十五石六斗、二升五合、油一升、煑麪一斗、一石五斗六升二合、膏糜、一人三合、用糯米三十七石五斗、菜一人五兩、三千九百六斤四兩、羊頭蹄六百二十五具、充簽醬、羊肝肺肚六百二十五具、并血充羹、鹽三人一合、四石一斗六升七合、醬人半合、六石二斗五升、醋人一合、一十二石五斗、椒五人一合、二石五十、薑十人一兩、七十八斤二兩、葱二人一兩、三百九十斤十兩

礦砂

宋史食貨志曰、阬冶、凡金銀銅鐵鉛錫監冶場二百有一、金產商饒歙撫四州、南安軍、銀產鳳建桂陽三州、有三監、饒信處越衢處道福汀漳南劍韶廣英連恩春十七州、建昌邵武南安三軍、有五十一場、秦隴興元三州、有三務、銅產饒處建英信汀漳南劍八州、南安邵武二軍、有三十五場、梓州有一務、鐵產徐兗相三州、有四監、河南鳳翔同虢儀蘄黃袁英九州、興國軍、有十一冶、晉磁鳳澧道

渠合梅陜耀坊虔汀吉十四州有二十務信鄂連建南劍五州邵武軍有二十五場鉛產越建連英春邵衢汀漳南劍十州安南邵武二軍有三十六場務錫產河南南康虔過賀潮循七州南安軍有九場水銀產秦階商鳳四州有四場朱砂產商宜二州富順監有三場冶之興廢不常而歲課增損隨之皇祐中歲得金萬五千九十五兩銀二十一萬九千八百二十九兩銅五百一十萬八百三十四斤鐵七百二十四萬一千斤鉛九萬八千一百

五十一斤錫三十三萬六百九十五斤水銀二
二百斤其後以赦書從事或有司所請廢冶百餘
既而山澤興廢至治平中或增冶或復故者六十
有八而諸州阬冶總二百七十一登萊商饒汀南
恩六州金之冶十一登虢秦鳳商隴越衢饒信虔
郴衡漳汀泉建福南劍英韶連春二十三州南安
建昌邵武三軍桂陽監銀之冶八十四饒信虔建
漳汀南劍泉韶英梓十一州邵武軍銅之冶四十
六登萊徐兗鳳翔陝儀邢虢磁虔吉袁信澧汀泉

建南劍英部渠合賫二十四州、興國邵武二軍、鐵之冶七十七、越衢信汀南劍英部春連九州、邵武軍、鉛之冶三十、商虢虔道賀潮循七州、錫之冶十六、而水銀丹砂之冶、與至道天僖之時、則一皆置吏主之、是歲視皇佑金減九千六百五十六、銀增九萬五千三百八十四、銅增一百八十七萬、鐵錫增百餘萬、鉛增二百萬、又得丹砂二千八百餘斤、獨水銀無增損焉、元豐元年、諸阬冶金總收萬七百一十兩、銀二十一萬五千三百八十五兩、銅千

南渡尚如此何況全盛時且環宇遠過宋耶

四百六十萬五千九百六十九斤鐵五百五十萬一千九十七斤鉛九百十九萬七千三百三十五斤錫二百三十二萬一千八百九十八斤水銀三千三百五十六斤朱砂三千六百四十六斤十四兩有奇南渡坑冶廢興不常歲入多寡不同今以紹興三十二年金銀銅鐵鉛錫之冶廢興之數一千一百七十及乾道二年鑄錢司比較所入之數附之湖南廣東江東西金冶二百六十七廢者一百四十二湖南廣東福建浙東廣西江東西銀冶

一百七十四廢者八十四、潼川湖南利州廣東浙東、廣西江東西福建銅冶一百九、廢者四十五、舊額歲七百五萬七千二百六十斤有奇、乾道歲入二十六萬三千一百六十斤有奇、淮西夔州成都利州廣東福建浙東廣西江東西鐵冶六百三十八、廢者二百五十一、舊額歲二百一十六萬二千一百四十斤有奇、乾道歲入八十八萬三百斤有奇、淮西湖南廣東福建浙東江西鉛冶五十二、廢者一十五、舊額歲三百二十一萬三千六百二十

斤有奇、乾道歲入一十九萬一千二百四十斤有奇、湖南廣東江西錫冶一百一十八廢者四十四、舊額歲七十六萬一千二百斤有奇、乾道歲入二萬四百五十斤有奇、

唐順之曰、出礦地方杭州府桐廬富陽縣界五寶山、每百斤用生鐵五斤、煎得銀七八兩、銅三十斤、〔嘉靖三十七年、私開二日、〕紹興府會稽縣銀山、礦面沙泥、每百斤銀二兩五錢、礦未開、目今盜泥、日可得銀三四百兩、〔疏開、爲鄉宦所阻、〕寧波府觀海的山、每百斤銀七

八兩（同前）金華府義烏縣八寶山、每百斤低者出銀二十兩、極好者出銀六七百兩、日可出千石、江南第二礦也、（嘉靖三十八年礦徒私開五次）衢州府西安縣桐山源、鐵煎每百斤銀七八兩至二十兩止、日可出銀千餘兩、（嘉靖五年以來、礦徒三四千人日日私開）開化縣大尖塢、鐵鉛煎每百斤銀三兩至八兩止、日可出三百兩、（嘉靖十八年王太監開一次、三十七年胡軍門委宋照磨陳百戶官開、納稅三百兩、後李知縣申文禁開）江家塢、每百斤銀三兩、鉛四五十斤、日可出一二百兩、苦竹坑泥礦、每百斤出銀一兩、日可得銀千兩、處三

（同前）嚴州府淳安遂安界梓樹塢，每百斤三兩起至二十兩止；老山每百斤出銀二兩，日可出二百兩。（私開五六年）杭州府於潛縣天目山，每百斤銀三兩；湖州府孝豐縣，每百斤銀三兩至二十兩止。（嘉靖三十八年胡軍門開四日，地方強不肯與開）江西廣信府常山玉山界，每百斤出銀三十兩，日可得三百石；永楊坑礦色如浙州礦，而礦味香甜，每百斤出銀三十兩至七八百兩止，江南第一礦也。（嘉靖三十五年私開大獲利，疏請官開而未行）池州府銅陵縣鐵石坦礦未詳。

擇礦法上等紫色者或黑色者嚼之如蠟其味如蜜每一兩煎得銀五錢者謂之金水平分此爲絕好其中或煎銀五錢以上者亦好次一等乃雞糞礦其形如麥芽碎碎塊黑白相兼每一兩煎銀八錢上下者又次一等乃黃沙礦其形黃色碎如米粒每一兩煎得銀六七錢者外有常號每一兩煎得銀二三錢以上四種該用之物不拘數目取多多益善大約以二十斤爲率可多不可少凡要得礦石就用本洞之土本地之水調和拌勻

如此開何患其擾故曰有治人無治法我亦曰有亂人無亂法

餅內好生封固毋令泄氣爲妙外有真出山一丟鉛取五六十斤每斤內有銀三五錢者取來作用開法以地方大戶主收煎以油糧戶主揉取假如礦一百斤值銀十兩油糧戶只作五兩賣與大戶使二八均利人已均稅納官官以廉能者董其役監取三日三夜通融計之什分取一取大戶并油糧戶甘結造清冊入官數日一納國稅如有利則開者必不自止如無利則開者自息矣

武備志卷一百四十三

防風茅元儀輯

軍資乘

餉 九

醫藥

茅子曰、軍中之疾、莫急於金瘡、故首之、次則其中藥毒者也、又次則烟火所傷者也、又次則墜馬馬咬者也、此四者非軍不傷、故先之、大軍羣聚、則有疫癘、時地相戾、則有襍症、嚴寒冐觸、則士有皸瘃、

譏毀憂危、則將有癰疽、故并附之、若其它、則自有岐黃家在也、

金瘡

中毒 溺死 壓死附

火傷

馬傷

疫瘧

雜症 卒死 霍亂 中暑 中寒 痲疹 喉痛

皸瘃

癰疽

金瘡

許洞曰、八爲兵器所傷出血者、必甚渴、卽不可與水飯所食之物、旋毛在吻、須乾食、食肥膩之物、無所妨害、貴解渴而已、不可過多、飲粥則血沸出、人必死矣、所忌者有八焉、一曰嗔怒、二曰喜笑、三曰大言、四曰勞力、五曰妄想、六曰熱羹粥、七曰飲酒、八曰酸鹹、此八者犯之、鮮有不死矣、夫金瘡不可治者有九、曰傷腦、曰傷天倉、曰傷臂中跳脈、曰傷

大腸小腸曰傷五臟此九者皆死處又有金瘡不可治者四焉曰腦髓出曰腦破而咽喉中沸聲兩目直視曰痛不在傷處者此謂傷經曰出血不止前赤後黑或自肌肉腐臭寒冷堅實其瘡難愈此四者皆不可療矣除此之外復論其脉脉虛細者生數實者死沈小者生浮大者死其所傷在陽處失血過度而脉微緩忽疾者死矣

唐順之曰夫金瘡者木乃春之權金乃秋之令春則萬物發生故曰春屬震以爲東方甲木之氣秋

則萬木凋零故曰秋屬兌以爲西方庚金之氣
金瘡乃刀斧劍刃之所傷故名金瘡其色所喜淡
紅色者良萬不失一所惡者紫紅色百無一生金
瘡屬金主與肺患金瘡者則忌咳嗽嘔噦翻胃肺
之症亦宜避風爲要盖風所屬巽木如風入瘡口
肺金反尅而成破傷則至瘡口浮腫潰爛故
名破傷風變生餘症患甚者多致不救雖有治法
宜辯瘡口淺深脉之虛實吉凶見矣所喜者胃氣
益旺飲食如常脾胃屬土胃氣旺則元氣壯氣血

生金瘡亦宜戒怒遠色、怒則瘡迸裂、變生胬肉、慾則瘡口腐爛、以損新肌、凡治金瘡、用敷口之藥、所主乳沒竭靈蓋乳石之類、自始至終、不可不用、此藥用之、則生肌止痛、活血全生、可保無虞、凡服湯藥、必以助胃補血爲主、以爲治金瘡之大意、金瘡雖有變易、各有治法、居於邊隘、不日刀箭之所傷、非此聖藥、安能治之、塞垣軍旅之間、罹於毒者、若非秘方、必至危殆者多矣、學者宜細觀之、

王鳴鶴曰、夫折傷者、謂爲物所傷於身體、或犯刀

斧或墜墮險地或爲撲跌傷筋挫骨損皮破肉或致傷生有死血出不止者有瘀血停積於臟腑結而不散者治之不早則有入腹攻心之患不可勝言凡遇前症當視所傷輕重如皮未破而肉損者必有瘀血停積先宜逐去瘀血然後和血止痛若肌肉裂破流血過多者宜調血養氣兼補脾胃爲主

治金瘡用百草方

五月五日平旦使四人出四方於五里外採一

方草木莖葉每種各半把勿令脫漏是日午時碓擣用極爛仍先揀好石灰一斗同杵之復選大實栟三兩杵鑿破作窽令可受藥然後分藥實於窽中堅築之畢即以麻皮繫之用麻擣石灰窖泥不令洩氣更以皮纏定令牢到九月九日午時取出陰乾百日藥成擣之暴令極乾更擣用絹羅之凡有金瘡傷所出血用藥封裹勿令轉動不過十日即瘥矣不膿不腫

傷後數日始得藥須先用溫水令血出即傳

又乳香方

乳香一兩 沒藥一兩三錢 天靈蓋五錢能壓邪不內關

血竭一錢 黃連二錢爲末如麪 花蘂石二錢要淡黑微黃者

珠末二兩能止痛生肌散血治肺家症候 金芮五片能鎮壓止痛生肌 黃丹一錢

右方用降眞姜擣爛同服幷傅瘡口一云用冬瓜一云用松枝嚼爛

又方

以童便一碗入酒半碗煎沸溫服以防惡血攻

心之患、

治金瘡肚腹腸出者

右以避風處、用麻油潤手、安腸入內、以桑皮作線縫之、更以熱鷄血塗上一夜、次用止痛生肌散、或花蕊散敷貼、仍用磁石三兩燒紅、醋七次擣碎、研如粉、鐵精三兩、滑石三兩、并爲細末、研勻、傅於腸胃、別將磁石末、用粥調下一錢、日三四服、或將前傅藥、溫酒調下亦可、

治金瘡至重者、用寸金丹、

天花粉三兩　姜黃一兩　赤石藥二兩　白芷一兩

右爲末凡筋斷脉絶血盡人危須用繩索及絹帶扎住血路然後用此藥以茶清調敷用軟絹縳之其血立止其腫頓消若金瘡着水番花者可用韮汁調敷瘡口兩傍以火微炙之或用稻稈烟薰之瘡口水出卽愈

治金瘡幷木石損傷者

用好陳石灰六兩研碎篩過綿紋大黃一兩切塊同石灰鍋中炒過紫色爲度去大黃再篩過

傳傷處立效、

治金瘡初傷者用辟風止痛方、

當歸五錢剉、微炒、 川椒五錢去目及閉口者微炒出汗 澤瀉五錢

芎藭一兩 附子一兩去皮臍

右擣羅爲末以溫酒調下一錢、日三服、

治金瘡疼痛不可忍者、用禁聲飲、

防風 天南星湯泡、各等分、

右爲飲片、每服五錢、水酒各一盞、生薑一片、煎

至八分、食遠溫服、三服有效、

治金瘡血出不止用龍骨方

龍骨一兩、剉、微炒、 芎藭一兩 熟地黃一兩

烏樟根三兩 突厥白一兩 鹿茸一兩、去毛、酥炙令微黃色、

右爲末、傅瘡上、血即止、如服、以溫酒調下二錢、日三服、

又方

馬齒莧 韮菜根 蓮鬚葱 陳石灰

右等分、共擣爲餅子、陰乾爲末、乾摻其血即止、

又方

白馬糞不拘多少

右晒乾爲末、乾摻其血即止、

又方

乳香 沒藥 兒茶 桒皮炒

龍骨水飛 石膏煆水飛 黄丹水飛 眞三漆

右各等分、爲末、摻之、其血即止、

又方

先以井花水一盆、用碎白紙浸於水中、凡血流之處、將水紙於四畔、流則再上、待止方可用藥、

治金瘡去血過多昏暈等症用芎歸湯

川芎五錢　當歸一兩

右共爲片水煎臨服入童便酒各一大杯熱服

治殺傷不透膜者

乳香一錢　沒藥一錢

右研爛以小便半盞好酒半盞同藥通口服然後用傳藥

又傳藥方

花蕊石散　龍骨或烏賊魚骨

右爲末、等分傅瘡口立止、

治金瘡內漏者金瘡通內血者爲內漏、腸脹不能食者死、瘀血脹在腹內、脈牢大者生、沉細者死、

虻虫三十枚、去翅足微炒、水蛭三十枚、微炒黃、桃仁一兩、湯浸去皮尖雙仁、麩炒微黃、桂心一兩五錢 川大黃三兩剉碎微炒、

右爲末、每服二錢、用童便一鍾、煎至五分、溫和滓服、日五服、夜三服、如無童便、用水并酒代、服訖然後傅藥、

又傅藥胡粉方

胡粉二兩　乾薑二分、爲末、　生栗子二分、陰去皮爲末

治金瘡內爛生蛆者

用皂礬飛過爲末乾摻、其蛆即死、

治金傷或壓傷、或墜傷、而瘀血在內、胸腹脹滿、喘

促氣短者、用當歸導治散、

當歸　大黃各二兩、

右共爲末、每服二錢、不拘時、童便和酒調服、

治金瘡腐肉未去者、用去腐散、

土丹水飛淨、一兩微炒、　天一石一兩、火煅通紅、取置地上出火毒、

右共爲末、用磁礶收貯、傅瘡上、待腐肉化爲黄水去盡、肉肌淡紅色、方換歛口生肌散、

治金瘡未收口者用蕊蝎歛口生肌散、

花蕊石一兩　乳香一兩爲末、沒藥一兩爲末、

右藥俱須極眞者、先將花蕊石在炭火中煅紅、於二末內蘸、令烟再煅、再煅再蘸、以末盡爲度、取出地上出火毒、

治破傷風先有破傷、風邪襲入瘡口、其症大似傷寒、而瘡口驟結白痂、是其驗也、或發熱或寒熱間作、甚則口禁目邪、身體强直、如角弓反張之狀、死在旦夕矣、法當同傷寒處治、因其有在

表在裏、半表半裏、三者之不同、故不離乎汗下和三法也、是故在表者汗之、在裏者下之、在半表半裏之間者宜和解之、初傷在表、用羌活防風湯、又不可過其法也、

羌活　防風　川芎　藁本

當歸　白芍藥　甘草各四兩

右㕮咀、每服各一兩、水二盞、煎至一盞、去滓溫服、不拘時、量緊慢加減用之、熱加黃芩大便閉

加大黃一兩、

治破傷風瘡瘇疼、痛、體發寒、熱、用玉眞散、

天南星一兩　防風一兩

右共爲末、傅於瘡口、又以香油潤之、後以溫酒調一錢服、

治破傷風牙關緊急、如角弓反張者、即以前方用二錢、以老酒入童便少許、嚾服立效、不愈、再一服有驗、

又方

天麻　白芷　川芎去皮、各二錢、草烏　雄黃各一錢

右爲末、酒和丸如桐子大、每服十丸、溫酒送下、

治破傷風痓口不語者

赤箭一兩 桂心三分 防風三分

巴豆二分去皮及心然後研之極爛用紙裹藥去油 附子三分去尖皮臍炮裂

吳茱萸五錢湯浸七次焙乾微炒 硃砂一兩水飛過

乾蝎五錢生用 天南星三分泡令裂白用 附子五錢泡制

右擣羅爲末用釅醋三升熬膏丸如梧桐子大

每服三丸不拘時候以熱葱酒下服後汗出效

治箭頭不出者

蜣蜋自死者一枚 土狗子三箇 婦人髮灰少許

右先將蜣蜋去殼取其白肉與二味同研如泥

用生油塗中箭處、塗後肉作癢、即以兩手蹙之、其箭自出、

治肉中箭頭不出者

巴荳一枚、去皮、膩粉一分 砒霜少許 磁石五錢、細研、蜣蜋一枚

右為末、以雞子清和、丸如綠豆大、先以針撥開瘡瘢、用生男子乳汁化一丸、再撥破處上、用醋麵紙封貼、常癢、癢極不可忍、其簇自出也、多年者兩上、當年者一上即出、

治骨中箭頭不出者

雄黃一錢 蜣蜋一分 石灰一分研作末以牛糞燒之令赤色

威靈仙一分 朝桂鼠一枚去頭取血

右四藥爲末入鼠血煅蜜爲丸如黃米大納瘡口中其箭不論遠近自出

治箭頭出後服食方

牡丹皮五錢 鹽五錢 白斂五錢

右爲末每於食前溫酒調下二錢

治毒箭所中者

笋根一兩 藍葉一兩 紫檀五錢 石灰二兩研作末以牛糞

火燒令赤、

右爲末、不拘時候、以藍葉汁調下一錢、粥飲下亦可、

又方

擣藍葉汁一升飲、滓傅瘡上、若無藍、取青布漬絞汁服之、幷淋瘡中、簇不出、擣鼠肝塗之、鼠腦亦可、用之即出、

又方

雄黃一分細研、　粉霜五錢細研、　巴豆三粒去皮、別研如泥、生用、

蜈蚣四兩研末生用

右用研勻以銅筋頭取乳汁塗點瘡上頻頻用之次日箭頭自出

治毒箭及馬汗方

蚕虫大者去翼於端午日收之陰乾爲末每服一錢挑破瘡口以藥傅之然後以醋麪糊紙厭面貼之即追出毒也

又方

石灰二兩研末以牛糞火燒令赤色　蜜陀僧一兩

黃栢五錢、剉以膩粉研爛爲末、

右共爲末、每用先以鹽水洗瘡後用藥傳之、日一換之、

治中毒箭後皮肉瘀𤷍者

梨母子一斤、煉研去核、　鹽麩子五兩、擣之、暴乾更擣、用絹羅之、去粗滓、

蒜荳三兩、炒熟、　石灰二兩、研末、以牛糞火燒令赤色、

藍子五兩　黃連三兩、去鬚、　獨顆栗子三兩、生用、

黑荳三兩、炒熟、　大糞灰五兩　赤芍藥三兩

右爲末、煉爲膏、每服一茶匙、日三四服、

治打撲損傷瘇痛者

用葱頭切爛炒焦搗搭患處、冷則再易、止疼消瘇散瘀、

武備志卷一百四十四

防風茅元儀輯

軍資乘

餉十

醫藥二

中毒溺死壓死附

治中百毒者凡中毒從酒得者難治酒性行諸血脉遍身體故難治也因食得者易治食與藥俱入于胃胃能容毒或逐大便泄出毒氣未流于血脉故易愈也

用甘草同黑豆煎湯嚾之

又方

以麻油灌之

又方

以芫荽根搗汁半盞和酒服之

又方

硇砂仁　生韭汁　藍石

右各單用水調下

又方

石菖蒲　白礬等分

右爲末、新汲水調下、

又方

淡豉 葱 麥門冬、

右水煎服

又方

眞雄黃 研末、

右冷酒服、凡諸藥汁解毒者、皆不可熱飲、能使毒氣愈甚、宜冷服之乃效、

治中砒霜毒者

鬱金末 二錢

右入蜜少許、冷水調服、

又方

升麻 不拘

右蜜煎冷服

又方

杏核 不拘

右連仁搗爲末、米飲調服

又方

白豆不[illegible]

右爲末冷水調服

又方

醬調水服

又方

飲釅醋以吐之

又方

飲水解之

又方

鉛粉不拘

右取地漿水調服

又方

寒水石　菉豆等分

右以藍根研水調下

又方

白芷不拘

右爲末，水調下

又方

救治

治中蠱毒者凡造蠱之家、用毒有日、如正月則用初一日、二月二日、三月三日、四月四日、五月五日、六月六日、七月七日、八月八日、九月九日、十月十日、十一月十一日、十二月十二日、凡蠱毒有五種、治法皆同、

馬兜零根 三兩

右㕮咀、分三服、水煎去滓、空腹頓服、隨時吐出蠱、未吐、再服、以吐爲度、

又方

生甘草 五錢

右以水濃煎頻服、吐痰即愈、

又方

胡荽根不拘

右搗汁半盞、不計時服、其蠱即下、和酒服尤妙、

白雞血亦好、

又方

鵓鴿熱血、隨多少服、

治中蠱吐血者

小麥麪一合

右分兩服、冷水調下、半日當下、

治中蠱下血者

蝟皮燒灰、細研、不拘、

右熟水調服二錢

又方

升麻不拘

右爲末、汲溪水調服、

治中酒毒者

大黑豆一升

右煑汁二升服一吐卽愈

又方

生螺螄肉

又方

葦澄茄

又方

葛花

治中百藥毒者

橫紋甘草

右截成小塊蔴油煎過、不拘時常嚼、久而致效

又方

生了蠶殼紙

右燒末細研、每服一錢、用冷水調下、頻服取瘥、雖中毒而面青脉絶腹脹吐血者、服之昰活、

又方

薺苨 以其與毒藥共處、毒皆歇也、

右取根擣汁飲

又方

藍汁

右用水調服

又方

白扁豆

右用水調服

又方

大小豆

右用水調服

又方

白礬爲末、一兩、

右水調嚾、耳鼻中皆出黑血、勿怪、

治中丹藥毒者

罌粟子研去子、煎至腐、入姜蜜和萱草根研十

服、再用四物湯香蘇散各一劑、和煎服、

又方

鉛粉

右地漿水調服之

又方

淡竹葉

右濃煎服之

又方

猪膚脇骨煎汁、研瓜蔞根汁飲之

又方

藍汁

又方

羊血

又方

菉豆

治中服附子酒多、而覺頭腫如斗、脣裂目流者、

急求黑菉豆各數合嚼之、及煎湯飲、

治服風藥多而悶亂不醒者

用醋嚾濃煎甘草、同生薑自然汁飲之、

又方

螺頭青

右細研、用新汲泉水調下、

治服諸藥過劑悶亂者

葛粉　胡粉　藍青汁　地漿　豉汁　乾薑
飴糖　黄連等分
右水調下、
治中飲食毒心煩悶者
苦參不拘
右煑汁飲之、吐出即止、
治中諸菜毒者
甘草　胡粉　貝母等分
右爲末水服

小兒溺服愈

治中瓜毒者

瓜皮湯服愈

又方

鹽湯服愈

治中柑毒者

柑皮湯服愈

治中梨毒者

梨葉湯服愈

又方

鹽湯服愈

治中野菜毒者

上漿水服愈

治中野菌毒而笑者

煎桑椹汁服愈

又方

急採鴛鴦草生啖之即忍冬草

又方

防風不拘

右剉碎以水煎候冷嚾之立愈

又方

石首魚頭

右以臼水濃煮嚾之

又方

土漿水飲三二盞愈

治中六畜肉毒者

壁土

右水調一錢服

又方

白扁豆不拘

右燒末服

又方

黄栢不拘

右燒末服

治中馬肉毒者

蔗[illegible]汁服愈

又方

蘆根作湯浴

治中馬肝毒者

狗糞不拘

右酒調服

又方

猪骨不拘

右燒末服

又方

生韭汁服、愈、

又方

頭垢吞服、愈、

治中狗肉毒者

杏仁 三兩

右和皮研、熱湯調、溫服三盞、吐出、愈、

治中牛肉毒者

豬牙 不拘

石灰水調服、

又方

井水

治中猪肉毒者

猪糞不拘

右燒末水調下、三服愈、

治中鴨肉毒者

糯米泔

右温服一中盞愈、

治中雞子毒者

醇醋

右飲數鍾愈

治中河豚毒者

梅花腦子不拘

右爲末水調服、

又方

五倍子　白礬等分

右爲末水調服、

又

藍青不拘

右援汁嚾下

又方

青黛不拘

右水調下

又方

生蘆根不拘

右擣汁服

治中諸魚毒者

橘皮不拘

右煑汁服

又方

馬鞭草不拘

右煑汁服

又方

黑豆

右煑汁服

又方

大黃 不拘

右煑汁服

又方

朴硝 不拘

右煑汁服

又方

生蘆根 不拘

右擣汁服

治中蟹毒者

紫蘇

右濃煎一二盞飲

又方

生藕不拘

右擣汁服

又方

乾蒜不拘

右煑汁服

治中鵃鳥毒者

生扁豆不拘

右爲末、溫水下、

又方

葛粉不拘

右以水調服

治中挑生毒者凡喫魚肉瓜菓皆可挑生、初中毒覺胷腹稍痛、明日漸加攪刺、滿十日、則物生、能動躍、騰上則胷痛、沉下則腹痛、腸下忽腫起如癰癤狀、頃刻間大如碗、以菉豆嚼試、若香甜即是、

擣小升麻爲細末、取冷熱水調二大盞連服之、洞下瀉出生蔥數莖根鬚皆具、瘫即消、續煎平胃散飲之、日食白粥即愈、

治中生挑毒在上膈者（即上則胷痛是也）

用熱茶一甌、投膽礬半錢于茶中、候礬化盡、通口呷服、良久即以雞翎探喉中、即吐出、

治生挑毒在下膈者（即下則腹痛是也、）

用米飲下鬱金末二錢、即瀉下其毒、次用人參白术各五錢爲末、用無灰酒納瓶內、慢火熬半

日許度酒熟溫溫服之每日一盞五日乃
後飲食如故
治悞食桐油者
飲熱酒解
又方
乾肺
又方
甘草汁服愈
治中瘴氣者

犀角

又方

雄黃

又方

麝香

又方

羚羊角

治中邪氣入腹者

升麻　犀角　射干等分

右々末水調服、

治中飛絲毒者

嚼蘇葉愈

治生漆惹人成毒者

生椒葉不拘

右煎湯洗

又方

雞子黃

右塗患處

又方

白松菜

治溺水死者 以下俱附

用皂莢為末、綿裹塞糞門、放大櫈上臥、脚後墊起一二磚、用鹽擦鼻中、待水自流出、切不可倒提出水、但心下溫皆可救、

又方

急解衣帶、用艾灸臍中、令二人以蘆管吹其耳即活、

治溺死微有氣及冬月凍死者

脫去濕衣、假人熱衣包之、用大米炒熱熨心上、炒竈土令熱、以囊盛熨心上、冷則緩之、令煖[illegible]通溫、以熱酒或薑湯或粥飲少許、灌之即活

治木石壓死并從高跌死、氣絕不能下者、

急擘開口、以熱小便灌之、

又方

用豆豉一大盞水兩碗、煎三沸、去渣服、

火傷

王鳴鶴曰、凡煙火所傷、切不可用冷水冷物、熱得冷氣則却而擊搏、爛人筋骨矣、

治方

用麻油煎黃蜀葵花傅上

又方。

用爛黃柑汁塗之

又方

多年白螺螄殼不拘

右火煆為末、瘡破乾摻、不破、清油調傅、

又方

側栢葉不拘

右擣爛傅

又方

寒水石　大黃　黃栢等分

右共爲末、密調傅之、

馬傷

治墜馬而內有瘀血者

地黃五斤

右搗碎置鐺中熬乾以無灰酒一十五升入鐺煎取三升去滓飲之

治劣馬咬傷者

絞馬糞汁服之并以此洗瘡愈

防風茅元儀輯

軍資乘

餉十一

醫藥三

疫瘧

治疫病

茵陳二兩 大麻仁五兩研如膏、豉五合炒、常山三兩

梔子二兩 芒硝二兩細研、鱉甲二兩塗醋令去裙襴、杏仁二兩湯浸、

去皮尖雙仁麩炒微黃色巴豆一兩去皮心炒令黃紙裹壓去油細研爲末

右合勻煉和搗幾百杵、丸如梧子大、每服三丸、粥飲下、或吐或利或汗、如不、再餌之、更不、以熱粥飲投之、老少以意加減、

又方、

梔子二十枚　乾葛五兩　大黃五兩　芒硝五兩

茵陳二兩

右爲散、討飲一服、必利、如不利、投熱粥數匙則利、

又方、

麻黄一兩、去根節、　牡蠣粉一合　蜀漆五錢
甘草五錢　犀角屑五錢　知母五錢

右爲末、用水二大盞、慢火煎、去滓、分爲三服、日起午初夜服之、

治疫病初起一二日、頭痛身熱、骨節痛、用芎蘇散、

川芎十兩　紫蘇一斤　陳皮十兩　茯苓十兩
甘草十兩　乾葛二十兩　半夏十兩　柴胡二十兩
枳殼十兩　桔梗十兩　香附十兩、炒、

右共爲末每用兩許薑葱送下衣覆取汗如冬月加白芷麻黄八兩

治疫病初起一二日諸症俱發兼飲食停滯嘔吐無汗等症及山巒瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛吐痢中暑冒風吐瀉不服水土用藿香正氣散

藿香二十兩 蒼朮炒一斤 厚朴炒一斤 陳皮一斤

半夏一斤 茯苓一斤 白芷一斤 桔梗一斤

紫蘇一斤 大伏皮一斤 甘草十兩

右共爲末每服一二兩薑湯下

治疫病三四日得汗後未解、眼眶痛、或寒熱往來、
口苦嘔吐、用柴胡雙解散、
柴胡　黃芩　半夏　人參　甘草
乾葛　茯苓　陳皮　芍藥各等分
右薑三片、棗一枚、水煎服、
治疫病三四日後、熱盛大便不通、用河間雙解散、
薄荷一兩　黃芩一兩　連翹一兩　石膏一兩
滑石七錢　川芎一兩　麻黃八錢　桔梗一兩
甘草一兩　朴硝五錢　荆芥一兩　防風二兩四錢

當歸一兩二錢　芍藥一兩　梔子一兩　白朮一兩五錢

大黃審病加減、

右共爲粗末、每用一兩五錢、再量病虛實加減、白滚湯下、煎服亦可、

治天行瘖時氣、

甜瓜蒂　丁香　赤小豆各四十九枚

右三味爲末、和井花水服之、然後取赤大荳作末、分吹兩鼻中、須臾取汗、黃色如蘗、及出黃水、或痢、或吐、皆愈、

治瘧疾初發，用藿香正氣散一二服，二三發後

鬼哭丹截之。

黑豆四百九十粒 菉豆四百九十粒 雄黃二兩五錢 信石二兩

右為末，蒸餅為丸如芡實大，每服一丸，冷水下，

忌熱飲食一日。

治山瘴發瘧者

常山三兩 烏梅二十七枚 獨顆蒜一枚 甑帶三寸

右以酒二大盞煎一大盞，作二服，初一服未發

時吃，次一服將發時候服，安臥頭左側，

雜症

治卒暴百病、中惡、口禁、停尸、卒死、及心腹諸疾者、用備急丸、

巴荳　大黄　乾薑各等分

右爲末、蜜糊杵千下、丸如小豆大、三丸、苦酒下、如口不開、折齒灌之、或提其髮、用匙鑰勾開下齒、亦可嚾入、

治霍亂吐瀉方

桑葉一握　扁竹一握

六錢剉末用水二大盞服、

治中暑霍亂用益元散、

滑石 六兩 甘草 一兩

右共爲細末、凉水調下、如冬月發、炒塩湯調下、

治中寒霍亂

吴茱萸 塩炒、

右煎服、再用茱萸煎湯熨臍下、

治中暑者用、黄連香薷飲、

黄連 半斤 香薷 一斤 厚朴 半斤 甘草 四兩

右每用四兩水一大釜煎二三沸、去渣凉服、暑月無病、亦宜遍與服之、則無中暑之患、

治中暑途中死者

移置陰處、急取路上熱土、於死人肚上作窩、多令人尿溺於臍中、又取路上熱土并大蒜同研爛、水調去滓、嚾下、切不可用冷水嚾沃、及以冷物逼外、得冷即死、

治中寒厥冷僵仆者

急以繩束葱一斤、切去兩頭如餅式、火上燒熱

安臍下上用火熨之。即甦。無葱則以湯濕布衣。

臍下上用帶火熱灰熨之。

又服藥方用附子理中丸。

人參　甘草炙　白朮　乾薑炮　附子製各等分人參減半

右為丸雞子黃大滾沸湯擂下。

治痢疾初發用化滯丸。

丁香一兩　胡椒一兩　巴豆霜一兩

右為末麪糊為丸菉豆大每服二十丸量人加減白湯下。

治痢疾應止及泄瀉者、用加味香連丸、

五倍子炒、四兩、黃連炒、二兩、吳茱萸一兩木香一兩

右爲末、煑棗肉爲丸梧桐子大、每服三四十丸、

米湯下、

治血痢

生犀角五兩阿膠炒、四兩、黃蘗四兩艾葉二兩

乾薑二兩

右爲末、米飲湯調下、

治咽喉一時疼痛、水米難入者、

急用土牛膝草根、不拘多少、洗淨搗爛、加水一大杯、米醋半小盞、絞汁、徐徐嗽吐其汁、嗽盡、即效、

皸瘃、音巾諄

許洞曰、士卒涉水踏冰、蒙犯霜雪、寒風所切、凌凍所苦、或失於飲食、肌體虛劣、故頭目手足皸瘃血出也、

治方

一猪脂洗之立止、

又方

川椒四合、以水煑之、去滓清之、半食須出令濼、須臾後浸乾、即塗羊脂腦髓、

又方

取艾葉濃煎汁熱洗之、即愈、

治皸瘃已成瘡者

以羊髓熬成膏油、入黄丹攪勻、令凝塗三五日、即愈、

又方

用清油半兩以慢火煎沸入黄蠟一塊同煎、溶入官粉五倍子末少許熬令稠紫色爲度先、以熱湯洗火上烘乾、即用藥傅上、以薄紙貼之、

又方

用瀝青一兩、黄蠟一兩、共熬攪匀瓦礶盛貯先、以熱湯洗令皮軟拭乾、將藥用慢火略烘溶傅之、

又方

用茄子根濃煎、湯洗過、以黄栢爲末、豬油調傅、

治手足指節皸裂欲墮者、

用萊州青石作器物者以刀細刮取末如欲落指節、尚有柱紋縷微連便以石末厚覆其上以帛纏之止痛十日即安矣、

癰疽、

治諸毒用萬病解毒丹、

山茨菇皮、洗焙 文蛤一名五倍子、二兩槌破、洗焙、 千金子去殼、揀色白者、紙包研、去油成霜、一兩、 紅牙大戟一名紫大戟、一兩五錢洗焙、

瑞香三錢、研、

右製法宜端午、七夕、重陽或天月德黃道上吉日修合量藥多寡、預期數日前主人及醫者俱齋戒沐浴、於靜室焚香、將前五味各爲極細末、重羅兩遍、依方用糯米濃飲調和、於木臼內杵千下極光潤爲度、每錠重一錢、每服一錠、病勢重者連服、通利一兩行、用溫粥補住、一切飲食藥毒蠱脹瘴氣惡菌、河豚死牛馬蛇蟲等諸毒、並用涼水磨服、南方蠱毒瘴癘傷人、纔覺意思不快、即磨服一錠、或吐或利、隨手便愈、癰疽發

背對口天蛇頭無名疔瘇楊梅等一切惡瘡諸
風隱疹赤瘇未破及痔瘡並用無灰淡酒磨服
及用凉水調塗瘡上日夜各數次覺痒立效
治一切癰疽托裏止疼痛護臟腑用仙方蠟礬丸
黃蠟一兩黃色好者溶開離火白礬一兩
右和勻用衆手急丸梧桐子大每服十丸漸加
至二十丸熱水或溫酒送下日進二服即消
治發背癰疽去病根免傳變不動元氣用轉毒丹
車螯一兩紫背光厚者以鹽泥固濟煅令通紅候冷淨取末甘草一分

輕粉五分

右共爲細末、每服四錢、溫酒調下、

治癰疽發背用神仙截法、

眞蔴油斤煎十數沸、傾出候冷、

右用無灰酒二碗、浸油内、重湯溫五大盞許、稍熱通口急服、一日盡之爲妙、

治癰疽便毒用如神散、

明白礬不拘多少

右端午日曬、臨用取五錢爲細末、葱白七根、搗

爲大丸、以滚酒送下、汗出爲度、

治發背及小癰癤、用立效散、

紫色皂角刺半斤、不用枯者、細剉、火炒赤、生粉草二兩

乳香五錢、別研、沒藥五錢、別研、瓜蔞五箇、去皮取肉并仁、研碎、炒黃色、如乾者不必炒、

右共爲細末、每服二錢、無灰好酒調下、無時候、

治有尖小癰癤疼痛發熱者

生粉草節、不炙不焙、只日晒乾、若無日、只於焙籠蓋上微火烘乾、碾爲細末、以熱調二三錢服

連進數服疼痛與熱皆止

治小癧瘰初起者

橄欖核 七枚

右燒灰存性碾爲末、酒調下、連服即消、即潰亦易治、

治一切瘡毒、不問巳潰未潰、焮痛發熱者、

槐花 一升炒黃

右熱酒調服、即消